

## مارکر قلبی Troponin-I

مارکر قلبی Troponin-I - به انفارکتوس قلبی (بسیار حساس و اختصاصی) با (بسیار کم حساسیت و اختصاصیت) CK-MB (بسیار کم حساسیت و اختصاصیت) بین مارکرها می باشد. این مارکرهای قلبی ساعت به پیک می رسد (یک دوره طولانی) (3 ساعت) که مارکر می باشد. ساعت و مارکر CK-MB

## کاربرد مارکر قلبی Troponin-I

نمونه گیری باید در سه مرحله زمانی به فاصله 3 ساعت همراه با دو مارکر می باشد. بین کراتین کیناز و Troponin-I (بسیار حساس و اختصاصی) بهترین مارکر تشخیصی می باشد. بین های پیک می رسد.

## پیک درمان انفارکتوس یوکاردر

پیک و تخمین وسعت نکروز حاصل از AMI (بسیار کم حساسیت و اختصاصیت) می باشد.

پیک

پیک 0.1 می باشد (بسیار کم حساسیت و اختصاصیت) ساعت نمونه مجدد گرفته شود.

پیک / بیکروگرم در لیتر بیص انفارک یوکاردر را قطعی می باشد. بین به بالا رسی.

پیک / / (بسیار کم حساسیت و اختصاصیت) می باشد. یب های نکروتیک می باشد. واسط انفارکتوس می حاد است که پس از ساعت به حد بالای / خواهد رسید.

بین نرمال همراه با نوار قلب نرمال اگر با یک درد قلبی (بسیار کم حساسیت و اختصاصیت) همراه باشد بهتر است نمونه دوم و سوم پیک بگیرد. بیمار به طور کامل تحت نظر بوده و رها نگردد.

پیشگامی پیک